



Empresa Autorizada N-29/046
Apdo. de correos 41-Poligono Rancho Hermoso. Avda de las Salinas,s/n
Parcela B, 3-Bis- 29640 LOS BOLICHES - Fuengirola (MALAGA) SPAIN
OFICINA CENTRAL: Telefono: 952 46 50 21, FAX: 952 47 28 30
Email: info@europest.net --Webs: www.europest.net

NUEVAS TECNOLOGIAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL



Manchas Foliare

Mancha Negra del Rosal

Este hongo se desarrolla en verano y otoño sobre el follaje del rosal. Tiene la forma de manchas angulosas, o más o menos redondeadas, rojizas oscuras o violáceas, visibles sobre todo en la cara superior del limbo, mientras que la cara inferior está marcada por un punto esfumado, correspondiente al lugar de la infección primitiva.

Esas manchas aisladas o confluentes, alcanzan algunas veces más de 1 cm de diámetro; son particularmente típicas por la razón de que el micelio, casi únicamente subcuticular, se desarrolla de una manera visible bajo forma de una serie de pequeños hacedillos negruzcos, partiendo desde el centro de la mancha en forma de rayos.

La forma y disposición de las manchas varían notablemente según las variedades e intensidad del ataque.

El ataque intenso provoca la caída prematura de los folíolos, esta puede ser inmediata, mientras en otros casos se mantienen en el arbusto hasta alcanzar las manchas un diámetro aproximado a los 18 mm.

En ciertos casos, el debilitamiento producido en los arbustos se manifiesta por una disminución sensible del crecimiento de los brotes en longitud y en diámetro y termina con una floración mediocre.

No hay variedades de rosas inmune a la “mancha negra”, en las condiciones normales de jardín, algunas variedades son más susceptibles que otras.

Las hojas de 7 a 14 días son las más susceptibles; las condiciones de temperatura favorables son: 6 a 33°C, favorecida por un aumento en el porcentaje de humedad entre 85 a 100°C

Para más información y solicitud de control no dude en ponerse en contacto con nosotros, le atenderemos en un plazo máximo de 48 horas.....

